

après le dessus , il s'éveilla après une heure de sommeil , la douleur de tête étant fort diminuée , mais la fièvre augmentée avec assez d'ardeur , une grande sécheresse à la peau , le mal de gorge & l'assoupissement continuant. La fièvre parut dans toute sa force sur les 8. heures du soir , & ne commença à se relâcher qu'à 2. heures après minuit , mais cette diminution ne fut bien sensible qu'à 5. heures du matin après avoir rendu un remède & sans moiteur à la peau. Le Vendredi sur les 10. heures le redoublement commença , le pouls devint plus petit & plus fréquent , les veines qui ont toujours été fort libres , parurent plus crûës , on s'apperçut d'un peu de froid aux pieds & d'un peu de pâleur au visage. Dans cet état il passa au chaud presque aussitôt avec accablement & douleur de tête au moindre mouvement. Alors on prit le parti de le faire saigner pour prévenir les suites d'une fièvre qui devenoit continuë , & qui pouvoit être suivie d'une petite verole , quoiqu'il n'y eut que des signes équivoques. Ce redoublement continuant après la saignée qui fut faite sur les 4. heures après midi , les raisons qui nous avoient déterminé à la première saignée subsistans , & l'évacuation n'étant pas suffisante pour nous mettre à couvert des accidens qui tous menaçoient la tête , pour prévenir aussi l'éruption qu'on auroit pu attendre sur la fin du redoublement du troisième jour ou au commencement du quatrième , on prit le parti de faire une saignée du pied à 11. heures du soir , elle fut d'abord suivie d'une liberté de ventre , qui nous fortifia dans les vûës qu'on avoit de donner cours à quelques humeurs qui étoient

dans