

découvert, depuis la jarrettière jusqu'à la partie inférieure & moyenne du *tibia*. Le blessé s'étant fait pancer par un habile Chirurgien de Nancy, qui ne manqua pas d'appliquer sur l'ulcère son digestif, avec le baume d'arcœus, afin de faire réunir les chairs; mais un mois entier s'étant écoulé, sans aucun succès, ce jeune homme me fit prier de lui donner du secours; alors le *tibia* restoit encore à découvert, de la longueur d'environ quatre pouces. Je lui conseillai d'appliquer la Plante en question, qui fit un si grand progrès que les chairs se réunirent d'abord, & qu'il fut parfaitement guéri cinq ou six jours après, sans aucune exfoliation de l'os.

NEUVIEME TENTATIVE.

1747. Un autre particulier, âgé de 27 ans, me fit le détail d'un anchilos incurable, dont il étoit incommodé dès l'enfance, & en même tems il me pria de le guérir d'un ulcère carcinomateux invétéré, situé sur la partie anchilosée, qui l'incommodoit beaucoup depuis deux ans. Après avoir examiné la partie ulcérée, je fis appliquer mon spécifique, qui fit un si prompt effet que dans la huitaine l'ulcère se trouva parfaitement consolidé & guéri. Ulcère qui n'avoit pû se guérir auparavant par l'usage & par l'application de quantité d'autres remèdes, que le malade avoit employés inutilement & sans aucun succès pendant les deux années précédentes.

DIXIEME TENTATIVE.

*Guérison d'une jambe ulcérée à l'âge de
85 ans.*

1752. Un ancien Chanoine de la Primatiale de Nancy
âgé