

Dès la seconde année de sa plantation, le *Ray-grafs* donnera jusqu'à trois récoltes, même quatre dans les terres de la première qualité.

La première récolte se fait au commencement du mois de Mai, la seconde les premiers jours de Juillet, & la troisième au mois de Septembre ou d'Octobre.

Ces tems pour recueillir le *Ray-grafs* ne sont pas tellement fixés qu'on ne puisse les dévancer ou les retarder. La règle générale pour avoir le foin de meilleure qualité, de quelque espèce qu'il soit, est de faucher au moment que l'épi commence à paroître, ou les fleurs à s'épanouir. Le foin fait alors avec attention, conservera un œil verd & une saveur toute différente : on perdra quelque peu du poids de la première coupe, mais les suivantes en seront plus abondantes & de meilleure qualité.

Lorsque le *Ray-grafs* aura été semé avec de l'avoine, il ne faudra pas attendre que celle-ci soit mûre, on la coupera en verd; le mélange d'avoine & de *Ray-grafs* est un fourage très-bon en verd pour les bestiaux; on pourroit même le fanner, mais il fera plus de profit étant donné en verd au bétail.

Un arpent de terre en *Ray-grafs* mêlé avec de l'avoine, donnera une récolte plus abondante du double qu'un arpent de prairie naturelle, d'autant plus que l'avoine coupée en verd, avant que la graine soit mûre, repousse une seconde fois. Ce regain est très-bon pour les bœufs, les vaches & les moutons.

Les trois coupes de *Ray-grafs* peuvent se fanner & être mises en foin, cela dépend du cultivateur. En Angleterre, la première & la troisième récolte se coupent ordinairement en verd pour engraisser