

rience, que la même étendue du terrain travaillée de cette façon, donne une récolte considérablement plus forte, que si elle étoit semée en plein, plusieurs essais qu'on en a faits en grand, a peu près de cette façon, pendant ces dernières années, ne laissent aucun doute sur l'avantage de cette culture.

Laquelle de ces méthodes au reste qu'on veuille suivre il faut la semer, soit entre la mi-Mars & la fin d'Avril, soit entre le 10. d'Août & le 10. de Septembre au plus tard.

1°. Dans un tems doux & dans une terre qui ne soit pas trop humide *.

2°. Plûtôt trop épais que trop menu.

3°. Enfin il faut se servir de bonne graine.

La bonne graine se distingue à la gouffe qui doit être d'un grain foncé, grosse graine & garnie d'un côté de petites pointes ; veut-on s'assurer davantage de sa fécondité il faut en ouvrir quelques-unes, si le grain qui est contenu est noir & ridé, c'est une marque certaine qu'il s'est échauffé lorsqu'on a mis la graine en tas ; s'il est blanc & ridé, c'est qu'elle n'étoit pas meure lorsqu'on l'a cueillie, la première espèce ne leve point du tout, la seconde produit quelquefois une plante, mais elle jaunir & périt avant que d'être parvenue à un certain degré de vigueur.

Le grain, pour être sain & fécond, doit être grainé & luisant, & si avec cela il est d'un roux jaunâtre il ne laisse rien à désirer.

La graine leve ordinairement quinze jours ou trois semaines après avoir été semée, mais une pluie survenue d'abord après, l'avance de plusieurs jours : si, quand elle a pris racine, elle se trouve trop épaisse on peut l'éclaircir avec un petit sarcloir pour donner aux autres plantes assez de place pour s'étendre.

Si le champ n'a pas été extrêmement bien netoyé il s'y trouvera vers l'Été toute sorte de mauvaise herbe, qu'il faut détruire, & sur-tout les espèces qui s'élèvent plus haut afin qu'elles n'étouffent pas les plantes d'Esparcette. En réitérant ce travail jus-

ques

* Car le trop d'humidité feroit crever le grain, qui alors ne sauroit lever.