

ver solitaire n'est pas un composé de cucurbitains, mais une espèce particulière.

» XVIII. Relation d'une hernie de grandeur extraordinaire, par Mr. le Docteur Georges Carlisle. » Le sujet affligé de cette hernie étoit un vieillard de 80 ans, & il y avoit plus de 50 ans qu'il en étoit incommodé. Le volume de cette hernie étoit si considérable, que dans sa plus grande longueur, depuis l'os pubis jusqu'au bord inférieur, elle avoit 15 pouces; sa plus grande largeur, quand elle étoit soutenue par les cuisses, étoit de dix-sept pouces & demi, & dans sa plus grande circonférence elle avoit 34 pouces.

XIX. Cet article est composé de trois mémoires, contenant diverses expériences faites sur l'air factice, par Mr. Henri Cavendish, Membre de la Société-Royale. Ces expériences paroissent très-ingénieuses; mais on les rendroit mal sans le secours des planches.

» XX. Description exacte, nouvelle & curieuse de la cochenille polonoise, par Mr. Wolf, de Varsovie, & communiquée à la Société-Royale par Mr. Henri Baker, l'un de ses Membres. » Mr. Wolf a envoyé à l'Auteur de cet article des cochenilles mâles & femelles, qu'il décrit fort au long: il donne ensuite une description du *polygonum minus*, ou du *selerantzus* de Caspar Bauhin. C'est sur les racines de cette plante que s'attache cet insecte, particulièrement en Podolie & dans l'Ukraine. Cette plante est commune dans quelques autres Pays; elle croît & se multiplie aisément; il seroit à désirer qu'on tâchât de la transplanter & de la cultiver dans nos contrées; il n'est point rare, au reste, de trouver des cochenilles sur l'argentine & le fraiser: