hiver la ſeve eſt ſans activité dans les arbres, & que par conſéquent ceux qu'on abattoit alors, ſechoient plus vite. Le bois ſe conſerve en hiver dans ſon écorce; en été, il s'y gâte aiſément & les vers s'y mettent. Ces circonſtances ont donné une nouvelle force au préjugé. Il eſt faux cependant que la ſeve n'agiſſe point en hiver; elle s'épaiſſit pour ſe changer enſuite en bois. Mais quand cela ne ſeroit pas, il eſt certain que le bois coupé depuis le mois de Mars juſqu'au mois d'Août, ſeche plus vite, eſt moins ſujet à la vermoulure, & dure plus long-tems que celui que l'on coupe pendant l'hiver. La raiſon qu'on peut en donner, c'eſt que pour le bois coupé en hiver, le grand nombre des parties aqueuſes du tronc étant gelées, & s'évaporant plus tard, doivent néceſſairement cauſer la pourriture, le tems du dégel n'eſt pas propre à ſecher; dans le bois coupé plus tard, la ſeve étant dans une plus grande agitation, les pores plus ouverts, il eſt plus aiſé à la chaleur du ſoleil & à l'air d'y pénétrer & d'en tirer l'humidité. Le bois ſe reſſerre alors, ſe durcit, & devient par conſéquent plus durable. Il ne s'agit pour s'aſsûrer de cette vérité, que de faire une expérience qui eſt à la portée de quiconque eſt à même de couper un arbre dans les deux ſaiſons. Ce n'eſt pas aſſez de couper le bois dans le tems le plus favorable, il faut ſavoir auſſi que les arbres qui réuſſiſſent les mieux, ſont ceux qui croiſſent ſur les montagnes au levant ou au ſeptentrion. Il n'y a pas grand parti à tirer des pins, ſapins & autres arbres reſineux qui croiſſent dans des fonds bas & marécageux. Le meilleur bois eſt celui dont le tronc eſt éleve, & l'écorce égale.