

Maniere de se servir dudit remede.

UN Pleuretique ordinaire d'un âge médiocre, de bonne constitution, qui n'a ni vomissement ni cours de ventre, soit que la Pleuresie soit vraie ou fausse, ou que ce soit la Peripneumonie, étant dans les quatre à 5. premiers jours de la maladie, il faut le faire saigner du bras au premier instant qu'il se presente, en cas qu'il ne l'ait pas été déjà suffisamment; le mettre à la Diète de cinq bouillons en 24. heures, & aussi-tôt après la première saignée, il faut lui faire prendre un verre du remede, contenant 4 onces ou env rons ce qu'il faut continuer dans l'intervalle des bouillons; en telle sorte qu'en 24 heures de tems il en ait pris une pinte; ayez soin de faire chauffer le remede avant de le donner: la boisson ordinaire du malade sera de la Pissanne commune.

Si la fièvre est violente & l'opression forte, réitérés la saignée du bras le même jour sans discontinuer le remede, le lendemain on fera la saignée du pied, ensuite laissés agir le remede.

Si la fièvre & la douleur de côté cessent tout à fait, faut cesser de donner le remede, mais pour peu qu'il y ait de ressentiment de l'un, ou de l'autre, il faut le continuer jusqu'au troisième, quatrième, & même cinquième jour. Il est rare d'aller jusques là sans que le malade ne soit entierement guéri.

S'il survient une douleur de tête, ou si elle continuoit après la troisième saignée aussi bien