

que la fièvre & l'oppression, réitérés la saignée du pied.

Après l'entière guérison du malade, ce qui arrive le huit ou le neuf, faut purger doucement avec casse, manne, &c.

Quoique les temperamens ne soient pas égaux, ce remede convient à tout le monde, mais en cas que l'on s'aperçoive qu'il incommode, on doit diminuer la dose, & au lieu d'en prendre une pinte en 24. heures, faut la prendre en 36.

Si le malade, après les 5. premiers jours de sa maladie, n'a pas été saigné, faut le faire incontinent, une du bras & une du pied, & doubler la premiere dose, & prendra les suivantes à l'ordinaire.

S'il y a cours de ventre ou vomissement, on ne doit pas saigner, à moins qu'il ne soit récent, & que le poux ne soit plein, en ce cas on doit saigner une ou deux fois, & donner d'abord le remede, il arrêtera l'un & l'autre.

Ce remede est bon pour les enfans & les vieillards, avec cette difference, qu'aux Enfans depuis 6. jusqu'à 11. ans, il ne faut leur donner que le quart de la dose en 24. heures, & depuis 12. ans jusqu'à 25. la moitié.

On ne détermine pas le nombre des saignées dans cette maladie, c'est à la prudence des Medecins à les regler.

Si la maladie est compliquée & qu'il y ait hydropisie, il ne faut pas saigner, mais seulement donner le remede, & il fera le même effet.

Les femmes enceintes en quelque tems que