

d'Avril, Mai, Juin & Juillet. L'usage est de la semer avec de l'aveine, de l'orge, du bled noir, en observant de labourer la terre le plus à l'uni qu'il est possible. Il est plus avantageux de le faire avec du lin. Le petit labour qu'on donne à la terre, en arrachant le lin, est utile au Treffle. On mêle la graine avec de la cendre, pour la répandre avec plus d'égalité; une herse legere suffit pour la couvrir. Il est rare que cette herbe puisse être fauchée dès la première année; mais dès-lors elle produira une bonne pâture; les années suivantes, elle donnera deux ou trois coupes abondantes. La première se fera à la fin du mois d'Avril, ou au commencement de Mai; elle donnera, outre ces récoltes, un regain excellent dans l'Automne. Un Journal de *Trimene* produit plus d'herbes que trois Journaux de bonne prairie. Il est plus avantageux de la consommer en verd: elle engraisse promptement les bestiaux, sans leur causer aucune incommodité. On la coupe lorsqu'elle commence à entrer en fleur. On réserve pour avoir la graine, l'herbe de la seconde coupe; on la laisse mûrir parfaitement; on la bat, & on la vanne comme le bled. Cette plante n'exige aucune culture; il est cependant avantageux de la sarcler: elle réussit dans toutes les terres, & se plaît sur tout dans celles qui sont médiocrement humides. Lorsqu'un champ épuisé par d'autres productions ne donne plus que des récoltes foibles, on peut, en l'ensemencant la dernière fois, y mêler de la *Trimene*; au bout de trois ou quatre ans le terrain deviendra prairie, & si on veut le labourer, on verra qu'elle a amélioré le fond.

Nous ne devons point finir cet article consacré