longueur du tems, & formoit une bourse qui logeoit dans son fonds cette portion de l'épiploon, qui serroit à son entrée ce qui restoit dans la capacité, comme s'il y eut eu des cordons à cette bourse, & c'est ce qui faisoit l'étranglement; car il n'y en paroissoit point de la part de l'anneau qui me permît d'introduire mon doigt indice dans l'abdomen. Après l'avoir quelque peu dilaté avec les ciseaux, & la ligature faite à la partie restante de l'épiploon, je la coupai proche le kiste avec le bistouri: il en sortit un peu de pus enfermé dans le kiste.

L'opération fut achevée à la satisfaction du malade & des spectateurs; les principaux accidents cesserent à l'instant, mais l'inflammation & la tension du bas-ventre continuërent avec des nausées fréquentes.

Le 18. l'appareil fut levé à la même heure, tout fut trouvé en bon état, la fièvre ayant beaucoup diminuée. La tension & l'inflammation étant toujours la même, les saignées furent réïtérées, avec l'application des remèdes convenables sur tout le bas-ventre pendant huit jours que ces accidents ont durés, qui enfin se terminerent par un épanchement considérable de pus dans la capacité qui surprit le malade, & augmenta sa crainte.

Ce pus prit tout de suite son issuë par la playe pendant la nuit. Le 24. à 7 heures du matin je fus voir le malade à mon ordinaire, qui me fit part de sa surprise. J'ouvris le lit, je vis effectivement le malade baigner dans une quantité de pus noirâtre, fétide & répandant une odeur cadavereuse; je le rassurai en lui disant que c'étoit sa guérison: je le pansai à l'instant. Le pus continua à sortir avec une telle abondance,