

engraïsser le bétail au Printems & en Automne ; la seconde seulement est réservée pour être mise en foin.

Comme toutes ces récoltes se font avant que la graine soit mûre, lorsqu'on veut en recueillir, on réserve un canton uniquement pour la semence, qui se recueille lorsque l'épi est jaune & la graine prête à tomber. Cette récolte de semence peut se faire sur la première poussée du *Ray-grafs* ou sur la seconde; je ne conseille pas d'attendre à la troisième, la graine n'auroit peut-être pas le tems de mûrir, elle seroit moins parfaite.

La troisième récolte de *Ray-grafs*, celle qu'on fait au mois d'Octobre, est pour l'ordinaire moins considérable d'un tiers que les deux premières.

Le *Ray-grafs* est le premier des fourages, puisqu'on peut le couper dès le mois d'Avril pour le faire manger en verd aux bestiaux; il se fanne très-facilement. Il n'en est pas de même du *Trefle* & de la *Luzerne*; le *Trefle* coupé se noircit à la moindre pluye, & déchoit beaucoup plus en séchant que le *Ray-grafs*; les feuilles de *Luzerne* sont fannées avant que les côtons de cette plante ayent acquis le degré de dessèchement nécessaire pour qu'elle puisse se conserver pendant l'hiver; elle est par conséquent très-sujette à se moisir & à s'échauffer.

Le fourage de *Ray-grafs* est très-bon; les chevaux n'en peuvent manger de meilleur lorsqu'il est en sec. Il est excellent en verd pour les jeunes chevaux & pour toutes espèces de bétail; mais il faut le mêler avec de la paille quand il est en verd, & ne pas se presser de leur en donner trop tôt, à moins qu'on n'en eut suffisamment pour les nourrir jusqu'à l'hiver, parce qu'étant accoutumés à le manger pur, ils pourroient se dégoû-

*Avantages
du Ray-grafs.*