

gen. Wiederum ähnlich ist die Situation in Fällen ähnlich gelagerter Wirbelsäulenverletzungen, wenn z. B. myelo-meningocele Kinder nach der chirurgischen Behandlung nach Hause entlassen werden, wo sie keine geeignete Rehabilitation erfahren. Um so schwieriger wird die Situation dann, wenn beschlossen wird, das Kind längere Zeit hindurch in einer Spezialanstalt zu behalten. Das hat einen sehr ungünstigen Einfluss auf die Resozialisation des Kindes. Und genau aus diesem Grunde ist es wünschenswert, dass die Familie des Kindes am Rehabilitationsprozess teilnimmt. Kinder werden nach Verletzungen in allgemeinen chirurgischen Stationen untergebracht und nachdem die Spitalperiode beendet ist, werden sie den entsprechenden Rehabilitationszentren zugewiesen. Da haben wir dann dieselben Probleme wie wir sie auch bei Erwachsenen beobachten können: Unrichtige Skarifizierung, die eine Sekundärbehinderung verursacht, die dann oftmals einen Grad höher liegt, als die ursprüngliche Erkrankung. Den 4. Faktor formen medizinische Probleme, die mit dem Herzinfarkt, Geisteskrankheiten, den Altersschwierigkeiten verbunden sind. Modernes Management des Herzinfarkts und anderer cardio-vaskulärer Krankheiten muss eine frühe Anwendung aller Rehabilitationsmassnahmen beinhalten, wie z.B. ein frühes Dosieren körperlicher Anstrengungen. Daher sollten medizinische Abteilungen medizinische Rehabilitationsmöglichkeiten oder physiotherapeutischer Möglichkeiten jedweder Art haben, um die Zeit der Hospitalisierung des Patienten zu verkürzen. Beim Problem der Geisteskrankheiten werde ich nicht verweilen, da sie nicht mein Spezialgebiet sind. Ich kann nur sagen, dass in meiner innersten Ueberzeugung jedes Programm für mentale Krankheiten Rehabilitierungsaktivitäten enthalten sollte. Sogar akute Fälle von Neurasthenie müssen ausser einer Verabreichung von psychotropen Drogen mit einer geeigneten Physiotherapie behandelt werden, die körperliche und konditionelle Uebungen beinhaltet werden, die körperliche und konditionelle Uebungen beinhaltet sowie Sport und Beschäftigungstherapie. In diesen Fällen sollten wir das Bett eliminieren, da es den Faktor darstellt, der das Anwachsen der Zahl von behinderten Patienten begünstigt. Schwierigkeiten in Verbindung mit alten Menschen sollten ähnlich wie im Fall von Herzinfarkt behandelt werden.